

McDD: Multiple-complex Developmental Disorder.

De symptomen van McDD zijn te verdelen in drie groepen:

1. Stoornissen in de regulatie van affecten [angst en agressie: angst schiet door in paniek en boosheid in woede].
 - a. intense angst of gespannenheid.
 - b. vreesachtigheid of fobie meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen.
 - c. paniekaanvallen of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien/woedeaanvallen.
 - d. stemmingsschommelingen
 - e. frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties.

2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdsgenoten en volwassenen.
 - a. sociale desinteresse, vermijden van sociale contacten of grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden.
 - b. ontbreken van bestendige relaties met leeftijdsgenoten.
 - c. aanklappende haat-liefderelaties met name met volwassenen [met name de ouders].
 - d. diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen.

3. Stoornissen van het denken [hak op de tak springen, bizarre fantasieën]
 - a. onlogische gedachtegang of plotseling onnavolgbare gedachtesprongen [magisch denken, neologismen]
 - b. verwarring tussen fantasie en werkelijkheid.
 - c. gemakkelijk verward raken
 - d. overwaardige gedachten [grootheidsideeën, verhoogde achterdocht]