

# Stoornis van Rett:

## DSM-IV criteria

**Hoofdcategorie:** Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden.

**Subcategorie:** Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

299.80 Stoornis van Asperger  
(Rett's Disorder)

**A.** Alle volgende:

- (1) duidelijk normale prenatale en perinatale ontwikkeling
- (2) duidelijk normale psychomotore ontwikkeling gedurende de eerste vijf maanden na de geboorte
- (3) normale schedelomvang bij de geboorte

**B.** Begin van alle volgende, na de periode van normale ontwikkeling:

- (1) afname van de schedelgroei tussen de leeftijd van vijf maanden en 48 maanden
- (2) verlies van eerder verworven doelgerichte handvaardigheden tussen de leeftijd van vijf maanden en dertig maanden met de hierop volgende ontwikkeling van stereotiepe handbewegingen (bijvoorbeeld handen wringen of "handenwassen")
- (3) verlies van sociale betrokkenheid vroeg in het beloop (hoewel sociale interactie zich later wel ontwikkelt)
- (4) optreden van een slechte coördinatie van het lopen of de bewegingen van de romp
- (5) ernstige beperkingen in de ontwikkeling van de expressieve en receptieve taal met ernstige psychomotorische achterstand